

農 薬 抄 録

フェノチオカルブ

(殺ダニ剤)

(昭和60年 2月19日 作成)

(平成 元年 1月26日 改訂)

(平成 元年 8月18日 改訂)

(平成 5年 3月25日 改訂)

(平成 6年 3月24日 改訂)

(平成10年 7月 6日 改訂)

(平成21年 7月27日 改訂)

(平成26年 3月20日 改訂)

クミアイ化学工業株式会社

連絡先	クミアイ化学工業株式会社	研究開発部	登録課
担当者			

目 次

I. 開発の経緯	3
II. 物理的・化学的性状	4
III. 生物活性	18
IV. 適用および使用上の注意	19
V. 作物及び土壌への残留性	20
VI. 有用動植物等に対する影響	30
VII. 使用時安全上の注意、解毒法等	55
VIII. 毒性	56
1. 原体	
(1) 急性毒性	63
(2) 皮膚及び眼に対する刺激性	71
(3) 皮膚感作性	77
(4) 急性神経毒性	79
(5) 急性遅発性神経毒性	80
(6) 90日間反復経口投与毒性	82
(7) 反復経皮投与毒性	108
(8) 反復吸入毒性	109
(9) 反復経口投与神経毒性	116
(10) 反復経口投与遅発性神経毒性	120
(11) 慢性毒性及び発癌性	127
(12) 繁殖性及び催奇形性	168
(13) 変異原性	188
(14) 生体機能への影響	198
(15) 参考資料	203
2. 原体混在物及び代謝物	224
3. 製剤	243
IX. 動植物及び土壌等における代謝分解	255
開発年表	338

I. 開発の経緯

クミアイ化学工業株式会社は、新しい殺ダニ剤を創製することを目的として検討をした結果、N, N-ジアルキルチオカルバマート化合物群が殺ダニ活性を有することを見出した。これらの化合物群についてさらに検討を行った結果、S-4-フェノキシブチル=ジメチルチオカルバマート（フェノチオカルブ）を最も効果の高い化合物として選抜した。

フェノチオカルブが柑橘類に寄生するミカンハダニに高い防除効果をもつことを確認し、日本植物防疫協会を通じて、柑橘類に対して、B1-5452の試験名で園場に於ける効果確認試験実施し、ミカンハダニに対し高い防除効果を持つことを証明した。

一方、1979年以降、作物及び土壌残留試験、各種短期・長期毒性試験、代謝試験等を実施し、1984年に柑橘類（ミカンハダニ）について農薬登録申請し、1986年4月に登録取得した。

本化合物は、ミカンハダニの各成育ステージに殺ダニ効果を有するが、特に卵、幼虫および若虫に対して優れた効果を示す。また、本剤は既存殺ダニ剤の抵抗性ミカンハダニに対し、交差抵抗性を示さず、高い防除効果を示す。

なお、諸外国での登録状況は以下の通りである。

国名	使用剤型	登録取得年
中国	乳剤	1998年
台湾	乳剤	1988年

II. 物理化学的性状

1. 有効成分の名称および化学構造

(1) 一般名

フェノチオカルブ (fenothiocarb)

(2) 別名

商品名 パノコン (panocon)

試験名 B1-5452

(3) 化学名

S-4-フェノキシブチル=ジメチル (チオカルバマート) (IUPAC)

S-4-phenoxybutyl dimethyl(thiocarbamate)


S-4-フェノキシブチル=ジメチルチオカルバマート (MAFF)

S-4-phenoxybutyl dimethyl thiocarbamate

S-(4-フェノキシブチル)=ジメチルカルバモチオエート (CAS)

S-(4-phenoxybutyl) dimethylcarbamothioate

(4) 構造式



(5) 分子式

$C_{13}H_{19}NO_2S$

(6) 分子量

253.4

(7) Cas No.

62850-32-2

2. 有効成分の物理化学的性状

(1) 物理化学性

試験項目		測定結果 (測定条件)	測定方法/試験機関(報告年)
色調		白色	目視検査/ (2000年)
形状		固体 (結晶)	目視検査/ (2000年)
臭気		弱いゴム臭	官能法/ (2000年)
密度		1.227 g/cm ³ (20℃)	OECD109 比重瓶法/ (2000年) [GLP]
融点		39.5℃	OECD102 DSC / (2000年) [GLP]
沸点		248.4℃(3990Pa) 619.5K(大気圧; 算出値)	OECD103 DTA / (2000年) [GLP]
蒸気圧		2.68×10 ⁻⁴ Pa(25℃)	OECD104 気体流動法/ (2000年) [GLP]
解離定数		解離しない	OECD112 分光光度法/ (2000年) [GLP]
溶解度	水	33.8 mg/L(20℃)	OECD 105 フラスコ法/ (2000年) [GLP]
	ヘキサン	47.1 g/L(20℃)	OECD 105 フラスコ法/ (2000年) [GLP]
	トルエン	>500 g/L(20℃)	OECD 105 フラスコ法/ (2000年) [GLP]
	ジクロロメタン	>500 g/L(20℃)	OECD 105 フラスコ法/ (2000年) [GLP]
	アセトン	>500 g/L(20℃)	OECD 105 フラスコ法/ (2000年) [GLP]
	メタノール	>500 g/L(20℃)	OECD 105 フラスコ法/ (2000年) [GLP]
	酢酸エチル	>500 g/L(20℃)	OECD 105 フラスコ法/ (2000年) [GLP]
オクタノール/水 分配係数(log Pow)		3.51(20℃、pH7.1)	OECD 107 フラスコ振盪法/ (2000年) [GLP]
生物濃縮性		BCF _{ss} 低濃度区 47 高濃度区 55	12 農産第 8147 号 及び OECD305 / (2008年) [GLP]
土壌吸着係数 (K _f ^{ads} _{oc} , K _f ^{ads})		土壌Ⅰ 1495, 38.87(25℃) 土壌Ⅱ 1329, 17.15(25℃) 土壌Ⅲ 989, 22.26(25℃) 土壌Ⅳ 740, 11.10(25℃)	OECD 106/ (2000年) [GLP]
加水分解性		半減期 1年以上(25℃/pH 4,7,9)	OECD 111/ (2000年)
水中光分解性	自然水	半減期 6.3 日 (25℃, 49.2 W/m ² , 300~400 nm)	9 農産第 5089 号 / (2000年) [GLP]
	滅菌 蒸留水	半減期 6.8 日 (25℃, 49.2 W/m ² , 300~400 nm)	9 農産第 5089 号 / (2000年) [GLP]
熱安定性		150℃まで安定	OECD113 DSC 法 / (2000年) [GLP]
スペクトル		UV/VIS, MS, H-NMR, C-NMR, IR	OECD101 等 / (2000年) [GLP]

(2) 各種スペクトル

1) マススペクトル

EIにより測定したマススペクトルを図2に示した。フェノチオカルブの分子量253.4と一致する分子イオンのピークが見られた。また、表1、図1に示したように、フラグメントイオンピークもフェノチオカルブの部分構造と一致した。

CIにより測定したマススペクトルを図3に示した。フェノチオカルブの分子量253.4と一致する分子イオンピークが見られた。

表1 フェノチオカルブのフラグメント及び強度

m/Z	最高強度を100とした際の 各ピークの濃度
253	31
181	3
160	100
72	96





図1 フェノチオカルブの代表的なフラグメント

[EI+ mode]

• TIC

[TIC]
Data : 8258EI Date : 31-May-199 09:48
Sample: 2830-037 Fenothiocarb
Note : Operator : Mayumi Nagata
Inlet : Direct Ion Mode : EI+



• Mass

Spectrum





図2 フェノチオカルブのEIモードにおけるマススペクトル

[CI+ mode]

• TIC

[TIC]
Data : 8258CI Date : 31-May-199 10:03
Sample: 2830-037 Fenothiocarb
Note : Operator : Mayumi Nagata
Inlet : Direct Ion Mode : CI+



• Mass

Spectrum




図3 フェノチオカルブのCIモードにおけるマススペクトル

2) ^1H -NMR スペクトル

フェノチオカルブの ^1H -NMR スペクトルを図5に示した。また、スペクトルデータをフェノチオカルブの構造に帰属させ、表2及び図4に示した。

表2 フェノチオカルブの ^1H -NMR スペクトルにおけるピーク帰属

ケミカルシフト(ppm)	プロトン数とカップリング	Assignment
1.74~1.90	m, 4H	(a) CH_2 (b) CH_2
2.94	t, 2H, $\text{JH(c)-H(a)} = 6.8 \text{ Hz}$	(c) CH_2
2.97	s, 6H	(d) CH_3
3.94	t, 2H, $\text{JH(e)-H(b)} = 6.1 \text{ Hz}$	(e) CH_2
6.83~6.92	m, 3H	(f) CH , (g) CH
7.21~7.26	m, 2H	(h) CH





図4 フェノチオカルブのピーク帰属図



3) ^{13}C -NMR スペクトル

フェノチオカルブの ^{13}C -NMR スペクトルを図7に示した。また、スペクトルデータをフェノチオカルブの構造に帰属させ、表3及び図6に示した。

表3 フェノチオカルブの ^{13}C -NMR スペクトルにおけるピーク帰属

ケミカルシフト δ (ppm)	カーボン数	Assignment
26.87	1C	(A) CH_2
28.34	1C	(B) CH_2
30.08	1C	(C) CH_2
36.58	2C	(D) CH_3
67.15	1C	(E) CH_2
76.68	—	CDCl_3
77.00	—	CDCl_3
77.31	—	CDCl_3
114.40	2C	(F) Ar-CH
120.48	1C	(G) Ar-CH
129.34	2C	(H) Ar-CH
158.88	1C	(I) Ar-C
168.21	1C	(J) C=O




図6 フェノチオカルブのピーク帰属図




図7 フェノチオカルブの ^{13}C -NMR スペクトル

4) IR スペクトル

フェノチオカルブの赤外吸収スペクトルを図8に示した。また、スペクトルデータをフェノチオカルブの構造に帰属させ、表4に示した。

表4 フェノチオカルブのIR吸収スペクトル帰属

吸収ピーク (cm^{-1})	ピーク形状	Assignment
3030~2900	M multiplet	C-H 伸縮 (ベンゼン環)
2925, 2850	M singlet	CH_2 伸縮
1640	M singlet	C=O 伸縮
1220	M singlet	C-N 伸縮
740	M singlet	C-S 伸縮




図8 フェノチオカルブの赤外吸収スペクトル図

5) 紫外(UV)スペクトル

フェノチオカルブの UV 吸収スペクトルを図 9～11 に示した。また、極大吸収の波長、吸光度を表 5 に示した。

表 5 極大吸収の波長及び吸光度

条件	極大吸収波長(nm)	吸光度	モル吸光係数 ϵ
中性 (蒸留水 pH=7.00)	269.5	0.5446	1322
酸性 (0.1M HCl pH=1.19)	269.5	0.5454	1324
アルカリ性 (0.1M NaOH pH=12.78)	269.5	0.5500	1335




図 9 フェノチオカルブの UV 吸収スペクトル (中性条件)




図10 フェノチオカルブのUV吸収スペクトル（酸性条件）




図11 フェノチオカルブのUV吸収スペクトル（アルカリ性条件）


本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクマイ化学工業株式会社にある。

3. 原体の組成

成分組成（構造式は後述）

区分	名称		構造式	分子式	分子量	規格値	通常値 又は レンジ
	一般名	化学名					
有効成分	fenothiocarb	S-4-phenoxybutyl diethyl (thiocarbamate)	①	$C_{13}H_{19}NO_2S$	253.4		
原体混在物							

成分組成 (構造式)

番号	名称	構造式
①	fenothiocarb S-4-phenoxybutyl diethyl (thiocarbamate)	

本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクミアイ化学工業株式会社にある。

4. 製剤の組成

(1) 35%乳剤 (パノコン乳剤)

フェノチオカルブ 35.0%

有機溶剤、界面活性剤等 65.0%

Ⅲ. 生物活性

1. 活性の範囲と作用機構

フェノチオカルブは、作物寄生性のダニ類（ハダニ科：ミカンハダニ、リンゴハダニ、ニセナミハダニ、カンザワハダニ、ナミハダニ、フシダニ科：ミカンサビダニ）に対し効果が認められ、特に、*panonychus* 属への効果が高く、ミカンハダニに対して極めて優れた防除効果をしめす。一方、温血動物、昆虫、ダニ類のアセチルコリンエステラーゼに対して殆んど阻害活性を示さない。

フェノチオカルブは化学構造上チオカルバマート類に分類される。チオカルバマート化合物の殺虫剤は少なく、その殺虫活性については不明な点が多いが、生体内で変化したスルホキシドは、酵素等をカルバモイル化し種種の代謝経路を阻害すると予想されている。

2. 作用特性と防除上の利点

フェノチオカルブのミカンハダニにおける殺ダニ剤としての作用特性と防除上の利点は次の通りである。

- (1) ミカンハダニの各成育ステージに殺ダニ効果を有するが、特に卵、幼虫および若虫に対して優れた効果を示す。
- (2) 既存殺ダニ剤の抵抗性ミカンハダニに対し交差抵抗性を示さず、殺ダニ剤の基幹薬剤として使用できる。
- (3) 低温条件下でより安定した防除効果を発揮する。
- (4) 各種殺菌剤および殺虫剤との混用が可能であり、病害あるいは害虫との同時防除ができる。

IV. 適用及び使用上の注意

1. 適用病害虫の範囲及び使用方法

1) 35%乳剤（パノコン乳剤）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェニチンを含む農薬の総使用回数
みかん	ミカンハダニ	700～1500 倍	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内

2. 使用上の注意事項

(1) 35%乳剤（パノコン乳剤）

- 1) 石灰硫黄合剤の散布で葉害を生じやすい条件下では、本剤との混用によってさらに葉害を助長するおそれがあるので混用をさけること。
- 2) 本剤の高温時、ハダニ密度上昇時での使用は効果がふれることがあるので、所定の希釈倍数の高濃度で使用するこゝと。
- 3) ハダニ類は繁殖が早いので、散布はかけ残しのないようにていねいに行うこと。
- 4) 本剤の連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を増加させるおそれがあるので、できるだけ年1回の散布とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用するこゝと。
- 5) ゆず、大豆、いんげん、メロン、はくさい、だいこんには葉害を生ずるおそれがあるので付近にある場合にはかからないように注意して散布すること。
- 6) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- 7) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

3. 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

(1) 35%乳剤（パノコン乳剤）

- 1) 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう注意して使用するこゝと。
- 2) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう速切に処理すること。

V. 作物及び土壌への残留性

1. 作物残留性試験

(1) 分析法の原理と操作概要

試料をアセトンで抽出し、*n*-ヘキサンに転溶後、シリカゲルカラムにより精製し、ガスクロマトグラフィー (NP-FID) で定量する。

(2) 分析対象化合物

一般名：フェノチオカルブ

化学名：S-4-フェノキシブチル=ジメチルチオカルバマート

分子式： $C_{13}H_{19}NO_2S$

分子量：253.4

(3) 分析結果

次頁の通り。

本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクミアイ化学工業株式会社にある。

作物名 (栽培形態) (分析部位) 試験年度 (資料番号)	剤型 (有効成分量) 希釈倍数又は 使用量 使用方法	試料 調製 場所	使用 回数	経過 日数	分析結果 (ppm)			
					公的分析機関		社内分析機関	
					フェノチオカルブ		フェノチオカルブ	
					最高値	平均値	最高値	平均値
みかん (露地) (果肉) 昭和54年 (作残-1)	乳剤 (35%) 700 倍 600 L/10a 散布	静岡柑試	0	—	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001
			2	3	0.017	0.016	0.005	0.005
			2	7	0.011	0.010	0.004	0.004
			2	14	0.021	0.020	0.006	0.006
			3	3	0.052	0.051	0.008	0.007
			3	7	0.011	0.011	0.010	0.009
	乳剤 (35%) 700 倍 400 L/10a 散布	和歌山 果樹園試	3	14	0.012	0.012	0.009	0.008
			0	—	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001
			2	3	0.010	0.010	0.148	0.144
			2	7	0.008	0.008	0.106	0.096
			2	14	0.006	0.006	0.131	0.120
			3	3	0.010	0.010	0.218	0.217
			3	7	0.005	0.005	0.138	0.128
			3	14	0.010	0.010	0.182	0.170
みかん (露地) (果皮) 昭和54年 (作残-1)	乳剤 (35%) 700 倍 600 L/10a 散布	静岡柑試	0	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			2	3	5.63	5.42	6.00	6.00
			2	7	6.66	6.57	8.00	7.70
			2	14	6.28	6.16	4.80	4.50
			3	3	9.84	9.60	9.80	9.70
			3	7	10.3	10.2	11.6	11.0
	乳剤 (35%) 700 倍 400 L/10a 散布	和歌山 果樹園試	3	14	10.6	10.4	9.00	8.80
			0	—	0.03	0.02	<0.01	<0.01
			2	3	9.54	9.45	6.20	6.20
			2	7	6.48	6.42	5.20	5.20
			2	14	5.70	5.61	6.40	6.30
			3	3	11.9	11.6	6.60	6.60
			3	7	7.08	7.05	5.20	5.00
			3	14	7.26	7.23	6.20	6.00
みかん (露地) (果肉) 昭和55年 (作残-2)	乳剤 (35%) 1000 倍 800 L/10a 散布	静岡柑試	0	—	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001
			2	3	<0.005	<0.005	0.003	0.003
			2	7	<0.005	<0.005	0.009	0.008
			2	14	<0.005	<0.005	0.003	0.003
	乳剤 (35%) 1000 倍 500 L/10a 散布	鹿児島 果園試	0	—	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001
			2	3	<0.005	<0.005	0.007	0.007
			2	6	0.017	0.016	0.106	0.104
			2	14	<0.005	<0.005	0.007	0.007
みかん (露地) (果皮) 昭和55年 (作残-2)	乳剤 (35%) 1000 倍 800 L/10a 散布	静岡柑試	0	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			2	3	2.82	2.72	4.00	3.98
			2	7	2.53	2.42	3.50	3.46
			2	14	2.71	2.66	3.10	3.07
	乳剤 (35%) 1000 倍 500 L/10a 散布	鹿児島 果園試	0	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			2	3	7.54	7.44	7.92	7.86
			2	6	5.86	5.77	7.80	7.46
			2	14	6.07	5.74	7.40	7.20

本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクミアイ化学工業株式会社にある。

作物名 (栽培形態) (分析部位) 試験年度 (資料番号)	剤型 (有効成分量) 希釈倍数又は 使用量 使用方法	試験圃製 場所	使用 回数	経過 日数	分析結果(ppm)			
					公的分析機関		社内分析機関	
					フェノチオカルブ		フェノチオカルブ	
					最高値	平均値	最高値	平均値
みかん (露地) (果肉) 昭和57年 (作残参考)	乳剤(35%) 1000倍 500 L/10a 散布	広島県試	0	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			2	3	0.005	0.005	0.005	0.005
			2	7	0.005	0.005	0.007	0.007
			2	14	0.005	0.005	0.010	0.010
	乳剤(35%) 1000倍 500 L/10a 散布	神奈川 園試	0	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			2	3	0.013	0.012	0.023	0.022
			2	8	0.011	0.010	0.012	0.012
			2	14	0.007	0.006	0.008	0.008
みかん (露地) (果皮) 昭和57年 (作残参考)	乳剤(35%) 1000倍 500 L/10a 散布	広島県試	0	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			2	3	3.81	3.80	2.68	2.36
			2	7	3.52	3.27	1.84	1.68
			2	14	2.42	2.40	1.96	1.88
	乳剤(35%) 1000倍 500 L/10a 散布	神奈川 園試	0	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			2	3	11.1	10.8	7.68	7.44
			2	8	8.85	8.42	6.24	5.84
			2	14	8.48	8.32	5.92	5.68
みかん (露地) (果肉) 昭和59年 (作残参考)	乳剤(35%) 700倍 500 L/10a 散布	静岡柑試	0	—	—	—	<0.005	<0.005
			2	7	—	—	0.017	0.016
			2	14	—	—	<0.005	<0.005
	乳剤(35%) 700倍 500 L/10a 散布	佐賀県試	0	—	—	—	<0.005	<0.005
			2	7	—	—	<0.005	<0.005
			2	14	—	—	<0.005	<0.005
みかん (露地) (果皮) 昭和59年 (作残参考)	乳剤(35%) 700倍 500 L/10a 散布	静岡柑試	0	—	—	—	<0.01	<0.01
			2	7	—	—	5.96	5.94
			2	14	—	—	3.96	3.82
	乳剤(35%) 700倍 500 L/10a 散布	佐賀県試	0	—	—	—	<0.01	<0.01
			2	7	—	—	1.39	1.34
			2	14	—	—	1.35	1.29

本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクミアイ化学工業株式会社にある。

1-1. 作物残留性試験 (参考)

1. 作物残留性試験

(1) 分析法の原理と操作概要

試料をメタノールで抽出し、ジクロロメタンに転溶、アセトニトリル/*n*-ヘキサン混合溶媒でさらに転溶し、シリカゲルカラムにより精製。これをガスクロマトグラフィー (NP-FID) で定量する。

(2) 分析対象化合物

・フェノチオカルブ

化学名：S-4-フェノキシブチル=ジメチルチオカルバマート

分子式：C₁₃H₁₉NO₂S

分子量：253.4

(3) 分析結果

次頁の通り

試験結果

作物名 (栽培形態) (分析部位) 試験年度 (資料番号)	利型 希釈倍数 又は使用量 使用方法	試験 場所	使用回 数	経過日 数	分析結果(ppm)									
					公的分析機関					社内分析機関				
					7z/f7777		7z/f7777		7z/f7777		7z/f7777		7z/f7777	
					最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
みかん (露地) (果肉) 昭和57年度 (作農参考)	35%乳剤 1000倍 300L/10a 散布	広島 果試	0	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			2	3	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
			2	7	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
			2	14	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
みかん (露地) (果皮) 昭和57年度 (作農参考)	35%乳剤 1000倍 300L/10a 散布	神奈川 園試	0	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
			2	3	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
			2	8	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
			2	14	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
みかん (露地) (果皮) 昭和57年度 (作農参考)	35%乳剤 1000倍 300L/10a 散布	広島 果試	0	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			2	3	3.81	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
			2	7	3.52	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27
			2	14	2.42	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
みかん (露地) (果皮) 昭和57年度 (作農参考)	35%乳剤 1000倍 300L/10a 散布	神奈川 園試	0	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
			2	3	11.1	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
			2	8	8.85	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42
			2	14	8.48	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32

本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクミアイ化学工業株式会社にある。

2. 乳汁への移行性試験

フェノチオカルブは水稻および飼料用作物に適用が無いため、本試験は必要ないと考えられる。但し、過去にウシ体内における残留試験を実施しており、これらについては参考までにIX章に記載する。

3. 土壌残留性試験

(1) 分析法の原理と操作概要

- ・ 圃場試験および原体を用いた容器内試験：

試料を酸性条件下でメタノールで加熱（70℃）抽出し、ジクロロメタンへ転溶後、シリカゲルカラムを用いて精製する。精製後、アセトンへ転溶しガスクロマトグラム（FPD）で定量する。

- ・ ^{14}C 標識フェノチオカルブを用いた容器内試験：

試料をメタノール：水（3：1、v：v）混合溶媒で振盪抽出し、濃縮後に酸性条件下でジクロロメタンへ転溶する。ジクロロメタン層について薄層クロマトグラフィーを行い、各分析対象化合物に相当するスポットの部分を取り、液体シンチレーションカウンターにより測定する。

(2) 分析対象化合物

- ・ フェノチオカルブ

化学名：S-4-フェノキシブチル=ジメチルチオカルバマート

分子式： $\text{C}_{13}\text{H}_{19}\text{NO}_2\text{S}$

分子量：253.4

(3) 分析結果

① 圃場試験

分析機関：

試料調製 及び採取場所 土性 (年度) (資料番号)	供試薬剤 及び 処理方法	使用 回数	経過 日数	分析値 (ppm)			推定 半減期
				最高値	回数	平均値	
静岡柑試 洪積堆積土 (昭和 55 年) (土残-1)	乳剤 (35%) 1000 倍 希釈 800L/10a	0	—	<0.05	2	<0.05	約 7 日
		2	0	4.27	2	4.18	
		2	2	0.97	2	0.94	
		2	4	0.45	2	0.43	
		2	7	2.24	2	2.15	
		2	14	0.54	2	0.52	
		2	28	0.64	2	0.62	
		2	42	1.43	2	1.37	
鹿児島果試 火山灰砂壤土 (昭和 55 年) (土残-1)	乳剤 (35%) 1000 倍 希釈 800L/10a	0	—	<0.05	2	<0.05	約 16 日
		2	0	0.59	2	0.58	
		2	2	0.40	2	0.40	
		2	4	0.47	2	0.44	
		2	7	0.32	2	0.32	
		2	14	0.35	2	0.34	
		2	29	0.12	2	0.12	
		2	43	0.17	2	0.16	

②容器内試験

試験温度：30℃

分析機関：

試料調製 及び採取場所 土性 (年度) (資料番号)	供試化合物 及び 処理方法	使用 回数	経過 日数	分析値 (ppm)			推定 半減期
				最高値	回数	平均値	
静岡柑試 洪積堆積土 (昭和 57 年) (土残-2)	原体 4 ppm ／乾土	0	—	<0.05	2	<0.05	約 28 日
		1	0	3.69	2	3.66	
		1	3	3.31	2	3.22	
		1	7	3.38	2	3.32	
		1	15	2.63	2	2.50	
		1	28	1.84	2	1.84	
		1	56	1.50	2	1.38	
		1	116	0.81	2	0.76	
		1	168	0.75	2	0.67	
鹿児島果試 火山灰砂壤土 (昭和 57 年) (土残-2)	原体 4 ppm ／乾土	0	—	<0.05	2	<0.05	約 16 日
		1	0	3.31	2	3.28	
		1	3	2.81	2	2.78	
		1	7	2.82	2	2.72	
		1	14	2.25	2	2.19	
		1	28	1.56	2	1.53	
		1	56	1.19	2	1.16	
		1	116	0.81	2	0.81	
		1	168	0.66	2	0.66	

試験温度：29℃

分析機関：

試料調製 及び採取場所 土性 (年度) (資料番号)	供試化合物 及び 処理方法	使用 回数	経過 日数	分析値 (ppm)			推定 半減期
				最高値	回数	平均値	
農水省果試 (興津) 沖積砂壤土 (昭和 55 年) (土残-3)	¹⁴ C 標識 フェノキシベンゾ酸 1.75 ppm ／乾土	1	0	1.74	2	1.74	約 8 日
		1	2	1.42	2	1.40	
		1	4	1.28	2	1.24	
		1	7	0.968	2	0.940	
		1	14	0.551	2	0.530	
		1	28	0.296	2	0.279	
		1	56	0.210	2	0.198	
		1	112	0.111	2	0.101	
茨城農試 火山灰砂壤土 (昭和 55 年) (土残-3)	原体 1.75 ppm ／乾土	1	0	1.73	2	1.72	約 15 日
		1	2	1.44	2	1.40	
		1	4	1.32	2	1.31	
		1	7	1.20	2	1.14	
		1	14	0.940	2	0.922	
		1	28	0.572	2	0.550	
		1	56	0.401	2	0.375	
		1	112	0.169	2	0.159	

3-1. 土壌残留性試験 (参考)

(1) 分析法の原理と操作概要

試料をメタノール：水（3：1、v：v）混合溶媒で振盪抽出し、濃縮後に酸性条件下でジクロロメタンへ転溶する。ジクロロメタン層および水層それぞれを薄層クロマトグラフィーを行い、各分析対象化合物に相当するスポットの部分を削り取り、液体シンチレーションカウンターにより測定する。

(2) 分析対象化合物

①フェノチオカルブ

化学名：S-4-フェノキシブチル=ジメチルチオカルバマート

分子式： $C_{13}H_{19}NO_2S$

分子量：253.4

(3) 分析結果：

試験温度：29℃

分析機関：

本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクミアイ化学工業株式会社にある。

試料調製 及び採取場所 土性 試験年度 (資料番号)	供試化合物の 処理方法		経過 日数	測定値(ppm)											
	処理量	回数		フェノチオカルブ											
				最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値	最高値	平均値
農水省果試 (興津) 沖積砂壤土 (昭和 55 年) (土残-3)	¹⁴ C 標識 フェノチオカルブ 1.75 ppm ／乾土	1	0	1.74	1.74										
			2	1.42	1.40										
			4	1.28	1.24										
			7	0.968	0.940										
			14	0.551	0.530										
			28	0.296	0.279										
			56	0.210	0.198										
			112	0.111	0.101										
茨城農試 火山灰砂壤土 (昭和 55 年) (土残-3)		1	0	1.73	1.72										
			2	1.44	1.40										
			4	1.32	1.31										
			7	1.20	1.14										
			14	0.940	0.922										
			28	0.572	0.550										
			56	0.401	0.375										
			112	0.169	0.159										

VI. 有用動植物等に対する影響

1. 水産動植物に対する影響

(1) 原体

試験名 (資料番号) 及び検体	供試生物	一群当たりの 供試数	試験方法	試験水温 (℃)	LC ₅₀ またはEC ₅₀ (mg/L)				試験機関 (報告年)	記載頁
					24 hr	48 hr	72 hr	96 hr		
魚類急性毒性試験 (水生-1) [GLP] 原体 (98.8%)	コイ <i>Cyprinus carpio</i>	7	半止水式	21.9 ~ 22.0	>0.903*	0.519*	0.147*	0.0903*	(2003年)	32
ミジンコ 急性遊泳阻害試験 (水生-2) [GLP] 原体 (98.8%)	オオミジンコ <i>Daphnia magna</i>	20	止水式	20.0 ~ 20.3	3.23 (3.19)	2.4 (2.4)	—	—	(2003年)	33
藻類生長阻害試験 (水生-3) [GLP] 原体 (98.8%)	緑藻類 <i>Selenastrum capricornutum</i> (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	初期細胞数 1×10 ⁴ cell/ml	振盪培養	23.0	0-72hr EbC ₅₀ : 0.26* 0-72hr ErC ₅₀ : 0.31*				(2003年)	34

*実測値を基に算出した値 カッコ内は純度換算値

(2) 製剤 (乳剤)

試験名 (資料番号) 及び検体	供試生物	一群当たりの 供試数	試験方法	試験水温 (℃)	LC ₅₀ またはEC ₅₀ (mg/L)				試験機関 (報告年)	記載頁
					24 hr	48 hr	72 hr	96 hr		
魚類急性毒性試験 (水生-4) 35%乳剤 [GLP] (パノコン乳剤)	コイ <i>Cyprinus carpio</i>	10	止水式	22.8 ~ 23.1	>4.00	>4.00	1.16	0.304	(2003年)	35
ミジンコ 急性遊泳阻害試験 (水生-5) [GLP] 35%乳剤 (パノコン乳剤)	オオミジンコ <i>Daphnia magna</i>	20	止水式	20.2	6.45	5.93	—	—	(2003年)	36
藻類生長阻害試験 (水生-6) [GLP] 35%乳剤 (パノコン乳剤)	緑藻類 <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	初期細胞数 1×10 ⁴ cell/ml	振盪培養	22.5 ~ 23.4	0-72hr EbC ₅₀ : 1.09 24-72hr ErC ₅₀ : 1.41				(2003年)	37

(3) 参考

試験名 (資料番号) 及び検体	供試 生物	LC ₅₀ (mg/L)	試験機関 (報告年)
魚類急性毒性試験 (水生-7) 原体 (96.1%)	コイ <i>Cyprinus carpio</i>	48hLC ₅₀ 0.32 mg/L 96hLC ₅₀ <0.07 mg/L	(1985 年)
魚類急性毒性試験 (水生-8) 乳剤 (35%)	コイ <i>Cyprinus carpio</i>	48hLC ₅₀ 5.8 mg/L 96hLC ₅₀ 0.68 mg/L	(1984 年)
魚類急性毒性試験 (水生-8) 原体 (96.1%)	ヒメダカ <i>Orizias latipes</i>	48hLC ₅₀ 1.1 mg/L 96hLC ₅₀ <0.3 mg/L	(1984 年)
魚類急性毒性試験 (水生-8) 原体 (96.1%)	ニホンウナギ <i>Anguilla japonica</i>	48hLC ₅₀ 9.0 mg/L 96hLC ₅₀ 7.0 mg/L	(1984 年)
魚類急性毒性試験 (水生-8) 原体 (96.1%)	ニジマス <i>Oncorhynchus mykiss</i>	48hLC ₅₀ 4.3 mg/L 96hLC ₅₀ <1.2 mg/L	(1984 年)
魚類急性毒性試験 (水生-8) 原体 (96.1%)	マダイ <i>Pagrus major</i>	48hLC ₅₀ 0.009 mg/L 96hLC ₅₀ <0.006 mg/L	(1984 年)
魚類急性毒性試験 (水生-8) 原体 (96.1%)	ボラ <i>Mugil cephalus</i>	48hLC ₅₀ 0.025 mg/L 96hLC ₅₀ 0.008 mg/L	(1984 年)
魚類急性毒性試験 (水生-8) 乳剤 (35%)	ボラ <i>Mugil cephalus</i>	48hLC ₅₀ 0.056 mg/L 96hLC ₅₀ 0.020 mg/L	(1984 年)
ミジンコ類 急性毒性試験 (水生-8) 原体 (96.1%)	セスジミジンコ <i>Daphnia carinata</i>	3hLC ₅₀ 9.2 mg/L 24hLC ₅₀ 6.7 mg/L	(1984 年)
ミジンコ類 急性毒性試験 (水生-8) 乳剤 (35%)	セスジミジンコ <i>Daphnia carinata</i>	3hLC ₅₀ 21.9 mg/L 24hLC ₅₀ 12.5 mg/L	(1984 年)
魚介類急性毒性試験 (水生-8) 原体 (96.1%)	クルマエビ <i>Marsupenaeus japonicus</i>	48hLC ₅₀ 0.055 mg/L 96hLC ₅₀ 0.039 mg/L	(1984 年)
魚介類急性毒性試験 (水生-8) 乳剤 (35%)	クルマエビ <i>Marsupenaeus japonicus</i>	48hLC ₅₀ 0.21 mg/L 96hLC ₅₀ 0.15 mg/L	(1984 年)

1. 水産動植物に対する影響

(1) 原体

1) コイに対する急性毒性試験

(資料：水生-1)

試験機関：

[GLP 対応] (2003 年)

検体：フェノチオカルブ原体

純度：

供試生物：コイ (*Cyprinus carpio*)

供試数：1 濃度区あたり 7 匹×1 容器

平均体長：5.3 cm (5.1~5.5 cm)、平均体重：2.15 g (2.00~2.55 g)

暴露条件：水量：試験容器あたり 30 L

水温：21.9~22.0℃ 溶存酸素濃度：6.8~8.1 mgO₂/L pH：7.3~7.9

暴露条件：半水式 (暴露 48 時間後に試験液を交換)

調製方法：検体をメタノールを用いて 0.46, 1.0, 2.2, 4.6, 10 g/L の試験原液を調製し、この原液を用いて下記表に示す濃度の試験液を調製した。(助剤濃度：0.1 mL/L)

試験結果：

供試生物	コイ (<i>Cyprinus carpio</i>)	
試験種類	急性毒性試験	
設定濃度 (mg/L)	0.046, 0.10, 0.22, 0.46, 1.0	
測定濃度 (mg a.i./L)	0.0294~0.0423, 0.0746~0.0923, 0.182~0.216, 0.395~0.451, 0.800~0.958	
平均測定濃度 (mg a.i./L)	0.0356, 0.0855, 0.204, 0.433, 0.903	
対照区	無処理対照および助剤対照	
LC ₅₀ (mg a.i./L) *	24 hr	>0.903
	48 hr	0.519 (95%信頼限界：0.303~1.12)
	72 hr	0.147 (95%信頼限界：0.0902~0.231)
	96 hr	0.0903 (95%信頼限界：0.0511~0.164)
NOEC (mg a.i./L) * 96hr	0.0356	
死亡例の認められなかった最高濃度 (mg a.i./L) *	0.0356	

*実測値から算出した値

測定濃度は、暴露開始前、暴露 48 時間後の試験水交換時、暴露終了時、それぞれの濃度測定値の範囲を示している。平均測定濃度は、暴露開始前、暴露 48 時間後の試験水交換時、暴露終了時の濃度の対数平均値を示している。測定濃度が設定濃度の±20%を超過した (64~98%) したため、LC₅₀、NOEC、死亡例の認められなかった最高濃度は、平均測定濃度を用いて求めた。観察された症状として異常遊泳、遊泳不能状態、死亡が認められた。

2) オオミジンコに対する急性遊泳阻害試験

(資料：水生-2)

試験機関：

〔GLP 対応〕 (2003 年)

検体：フェノチオカルブ原体

純度：

供試生物：オオミジンコ (*Daphnia magna*) 生後 24 時間以内齢

供試数：一群 5 頭 4 反復

暴露条件：試験液：1 反復あたり 100 mL 水温：20.0~20.3℃

溶存酸素濃度：7.4~8.1 mgO₂/L pH：7.9~8.0

暴露条件：止水式

調製方法：検体をメタノールに溶解して試験原液 (10, 18, 32, 56, 100 g/L) を調製した。各試験原液を試験水に添加して 1.0, 1.8, 3.2, 5.6 および 10.0 mg/L の試験液 (助剤濃度 0.1 mL/L) を調製した。

試験結果：

供試生物		オオミジンコ (<i>Daphnia magna</i>)
設定濃度 (mg/L)		1.0, 1.8, 3.2, 5.6, 10
測定濃度 (mg a.i./L)		0.824~0.814, 1.73~1.64, 3.14~2.98, 5.04~4.92, 9.64~9.48
対照区		無処理対照および助剤対照
EC ₅₀ (mg/L) *	24 hr	3.23 (95%信頼限界：2.64~3.89) (3.19 (95%信頼限界：2.61~3.84))
	48 hr	2.4 (95%信頼限界：1.8~3.2) (2.4 (95%信頼限界：1.8~3.2))
NOEC (mg/L) * 48 hr		1.8 (1.8)
死亡例及び遊泳阻害例の認められなかった最高濃度 (mg/L) *		1.8 (1.8)

*設定濃度から算出した値。カッコ内は純度換算値

測定濃度の欄では、暴露開始時および終了時の測定濃度の範囲を示している。

暴露開始時および暴露終了時の測定濃度が設定濃度の±20%以内 (81~98%) であったため、EC₅₀、NOEC、遊泳阻害例の認められなかった最高濃度は、設定濃度を用いて求めた。

3) 緑藻 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) に対する生長阻害試験

(資料：水生-3)

試験機関：

[GLP 対応] (2003 年)

検体：フェノチオカルブ原体

純度：

供試生物：緑藻 (*Selenastrum capricornutum* *) ATCC 22662 株

初期細胞数： 1×10^4 cells/mL

*現学名：*Pseudokirchneriella subcapitata*

暴露条件：水温：23.0℃ 暴露条件：振とう培養 (100 rpm)

照度：4030~4740 lux (フラスコ液面付近) pH：7.8~10.4

調製方法：検体をメタノールに溶解し試験原液 (100 mg/L) とした。この原液を滅菌した試験培地に各所定量加えて下表に示す設定濃度とした。

試験結果：

供試生物	緑藻 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	
設定濃度 (mg/L)	0.056, 0.10, 0.18, 0.32, 0.56, 1.0	
開始時測定濃度 (mg a.i./L)	0.0455, 0.0855, 0.180, 0.330, 0.557, 0.984	
終了時測定濃度 (mg a.i./L)	0.0423, 0.0847, 0.173, 0.310, 0.514, 0.900	
対照区	培地対照	
EC ₅₀ (mg/L)	0-72 h EbC ₅₀	0.197 (95%信頼限界：0.187~0.208)
	24-72 h ErC ₅₀	0.306 (95%信頼限界：0.286~0.328)
NOEC (mg/L)	生長曲線；0.10 生長速度；0.18	

開始時の測定濃度が設定濃度の±20%以内 (81~103%) ため、EC₅₀ および NOEC は設定濃度を用いて求めた。

[申請者註]

暴露開始時及び暴露終了時の測定濃度の幾何平均値を用いて、各種 EC₅₀ 値及び NOEC を算出した場合、以下の通りとなる。

平均測定濃度 (mg a.i./L)	0.0439, 0.0851, 0.176, 0.320, 0.535, 0.941	
EC ₅₀ (mg/L)	0-72 h EbC ₅₀	0.26 (95%信頼限界：0.25~0.28)
	0-72 h ErC ₅₀	0.31 (95%信頼限界：0.29~0.33)
	24-72 h ErC ₅₀	0.31 (95%信頼限界：0.29~0.33)
NOEC (mg/L)	生長曲線；0.085	
	生長速度；0.085 (0-72 hr)、0.18 (24-72 hr)	

(2) 製剤

1) 35%乳剤のコイに対する急性毒性試験

(資料：水生-4)

試験機関：

[GLP 対応] (2003 年)

検体：パノコン乳剤

[組成] フェノチオカルブ 35.0%
 界面活性剤、有機溶剤等 65.0%

供試生物：コイ (*Cyprinus carpio*)

供試数：一群各 10 尾、平均体長：4.7±0.17 cm、平均体重：1.1±0.13 g

環境条件：水量：50 L 水温：22.8～23.1℃ 溶存酸素濃度：5.8～8.7 mgO₂/L

pH：7.0～7.4 曝露条件：止水式

調製方法：本検体を試験用水で希釈し、1000 mg/L の試験原液を調製した。この試験原液を試験用水に添加、攪拌し下記表に示す設定濃度とした。

試験結果：

供試生物	コイ (<i>Cyprinus carpio</i>)	
試験種類	急性毒性試験	
設定濃度 (mg/L)	0.00640, 0.0320, 0.160, 0.800, 4.00	
対照区	無処理対照	
LC ₅₀ (mg/L)	24 hr	>4.00
	48 hr	>4.00
	72 hr	1.16 (95%信頼限界：0.160～4.00)
	96 hr	0.304 (95%信頼限界：0.165～0.564)
NOEC (mg/L)	0.0320	
死亡例の認められ なかった最高濃度 (mg/L)	0.0320	

LC₅₀、NOEC、死亡例の認められなかった最高濃度は、設定濃度を用いて求めた。

主な毒性症状は、表層集中、平衡喪失、過活動、嗜眠状態、活動度の低下、死亡であった。

2) 35%乳剤のオオミジンコに対する急性遊泳阻害試験

(資料：水生-5)

試験機関：

[GLP 対応] (2003 年)

検体：パノコン乳剤

[組成] フェノチオカルブ 35.0%
界面活性剤、有機溶剤等 65.0%

供試生物：オオミジンコ (*Daphnia magna*) 生後 24 時間以内 供試数：一群 5 頭 4 反復

環境条件：培地量：1 反復あたり 100 mL 水温：20.2℃

溶存酸素濃度：8.4~8.9 mgO₂/L pH：7.4~7.6 暴露条件：止水式

調製方法：検体を試験用水に加えて混合し、1000 mg/L の試験原液を調製した。

これを試験用水によりさらに希釈し下記表に示す設定濃度とした。

試験結果：

供試生物		オオミジンコ (<i>Daphnia magna</i>)
設定濃度 (mg/L)		2.60, 3.64, 5.10, 7.14, 10.0
対照区		無処理対照
EC ₅₀ (mg/L)	24 hr	6.45 (95%信頼限界：5.93~7.00)
	48 hr	5.93 (95%信頼限界：5.46~6.45)
NOEC (mg/L)		3.64
遊泳阻害の認められなかった最高濃度 (mg/L)		3.64

EC₅₀、NOEC、遊泳阻害の認められなかった最高濃度は、設定濃度を用いて求めた。

3) 35%乳剤の藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) を用いた生長阻害試験 (資料: 水生-6)

試験機関:

[GLP 対応] (2003 年)

検体: パノコン乳剤

[組成] フェノチオカルブ 35.0%
界面活性剤、有機溶剤等 65.0%

供試生物: 緑藻 (*Selenastrum capricornutum**) *現学名 *Pseudokirchneriella subcapitata*

初期細胞数: 1.0×10^4 cells/ml

環境条件: 水温: 22.5~23.4℃ 曝露条件: フラスコ振盪 (100 rpm)

照度: 4000~4100 lux pH: 7.9~10.9

調製方法: 本検体を試験培地に加えて混合し、100 mg/L の試験原液を調製した。試験原液を試験培地に各所定量添加し下記表に示す設定濃度とした。

試験結果:

供試生物		緑藻 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	
設定濃度 (mg/L)		0.156, 0.313, 0.625, 1.25, 2.50	
対照区		無処理対照	
EC ₅₀ (mg/L)	0-72hEbC ₅₀	1.09	
	24-72hErC ₅₀	1.41	
NOEC (mg/L)		0.625 (生長曲線)	0.625 (生長速度)

EC₅₀およびNOEC は、設定濃度を用いて求めた。

2. 水産動植物以外の有用生物に対する影響

2-1 蚕

試験の種類・検体 (資料番号)	供試生物	1群 当りの 供試数	投与方法	投与量	試験結果	試験機関 (報告年)	記載 頁
蚕影響試験 原体 (99%) (有用-1-1)	蚕 <i>Bombyx mori</i> 3 齢起虫 春嶺×鐘月	1 群 5 頭 3 反復	局所施用	0.1, 1, 10 μ g/頭	10 μ g/頭で 死亡率 10% 1, 0.1 μ g/頭では 死亡例無し	(1984 年)	40
蚕影響試験 乳剤 (35%) (有用-1-2)	蚕 <i>Bombyx mori</i> 3 齢起虫 春嶺×鐘月	1 群 10 頭 6 反復	浸漬処理 経口投与	39.1, 78.1, 156, 313, 625, 1250 ppm	LC ₅₀ : 257 ppm		
蚕影響試験 乳剤 (35%) (有用-2-1)	蚕 <i>Bombyx mori</i> 4 齢起虫 春嶺×鐘月 秋光×竜白	1 群 50 頭 2 反復	桑葉経口 投与 (残留毒性 試験)	500 倍希釈 100 L/10a 1000 倍希釈 100 L/10a	安全日数 500 倍: 5 日 1000 倍: 3 日	(1984 年)	42
蚕影響試験 乳剤 (35%) (有用-2-2)	蚕 <i>Bombyx mori</i> 4 齢起虫 豊年×研白	1 群 50 頭 2 反復	桑葉経口 投与 (残留毒性 試験)	500 倍希釈 100 L/10a 1000 倍希釈 100 L/10a	安全日数 500 倍: 6 日 1000 倍: 2 日	(1984 年)	
蚕影響試験 乳剤 (35%) (有用-2-3)	蚕 <i>Bombyx mori</i> 4 齢起虫 朝日×東海 豊年×研白	1 群 50 頭 2 反復	桑葉経口 投与 (残留毒性 試験)	500 倍希釈 100 L/10a 1000 倍希釈 100 L/10a	安全日数 500 倍: 1 日 1000 倍: 1 日未済	(1984 年)	
蚕影響試験 乳剤 (35%) (有用-2-4)	蚕 <i>Bombyx mori</i> 4 齢起虫 錦秋×鐘和	1 群 50 頭 2 反復	桑葉経口 投与 (残留毒性 試験)	500 倍希釈 100 L/10a 1000 倍希釈 100 L/10a	安全日数 500 倍: 2 日 1000 倍: 1 日	(1984 年)	

2-2 ミツバチ

試験名称 (資料番号) 及び検体	供試生物	1 試験区 当りの 供試数	投与 方法	投与量	試験結果	試験機関 (報告年)	記載 頁
ミツバチ 影響試験 (有用-3-1) 原体 (99%)	セイヨウ ミツバチ <i>Apis mellifera</i> 日齢不明	50 頭/群 1 反復	局所 施用	50, 100, 200, 400 μ g/頭	24 時間後の死亡率 400 μ g/頭区: 80% 50 μ g/頭区: 2%	(1977 年)	46
ミツバチ 影響試験 (有用-3-2) 水和剤 (50%)	セイヨウ ミツバチ <i>Apis mellifera</i> 日齢不明	10 頭/群 2 反復	経口 投与	12.5, 25, 50, 100, 200 μ g/頭	24 時間 LD ₅₀ : 47 μ g/頭		

2-3 天敵昆虫

試験名称 (資料番号) 及び検体	供試生物	1群当りの 供試数	試験方法	試験結果	試験機関 (報告年)	記載 頁
天敵昆虫 影響試験 (有用-4-1) 原体 (100%)	ヤマトカサネ <i>Chrysoperla carnea</i> 2 齢幼虫	1 群 30 頭 1 反復	ドライフィルム法 1 μ gai/2 μ L/cm ²	死亡率 暴露 2 日後 36.7% 暴露 7 日後 90.0%	(2003 年)	48
天敵昆虫 影響試験 (有用-4-2) 原体 (100%)	チリカブリダニ <i>Phytoseiulus persimilis</i> 第一若虫	1 群 10~ 13 頭 3 反復	リーフディスク法 1 μ gai/2 μ L/cm ²	暴露 24 時間後 の死亡率 100%	(2003 年)	49
天敵昆虫 影響試験 (有用-4-3) 原体 (100%)	ナナホシデントウ <i>Coccinella septempunctata</i> 幼虫	1 群 15 頭 1 反復	局所施用試験 1, 10 μ g/頭	暴露 48 時間後の死亡率 1, 10 μ g/頭ともに 0%	(1984 年)	50
天敵昆虫 影響試験 (有用-4-3) 乳剤 (35%)	ナナホシデントウ <i>Coccinella septempunctata</i> 幼虫	1 群 5 頭 3 反復	虫体浸漬法 500, 100 ppm	暴露 48 時間後の死亡率 500 ppm 6.7% 100 ppm 0%		

2-4 鳥類

試験名称 (資料番号) 及び検体	供試生物	投与群 当りの 供試数	投与 方法	投与量	LD ₅₀ 及び 無影響量	観察された 影響等	試験機関 (報告年)	記載 頁
鳥類影響試験 (急性経口 毒性試験) [GLP] (有用-5) 原体 (96.5%)	コリンウズラ <i>Coturnix coturnix</i> <i>virginianus</i>	♂♀ 各 5 羽	強制 経口 投与	0, 518, 864 1440, 2400, 4000 mg/kg	LD ₅₀ ♂ 1013 mg/kg ♀ 878 mg/kg NOEL ♂ 518 mg/kg ♀ < 518 mg/kg	座り込み、ケージ への寄りかかり、 横たわり、鎮静、 立位不能、立毛、 姿勢不安定、閉 眼、瀕死、死亡	(1983 年)	52
鳥類影響試験 (急性経口 毒性試験) [GLP] (有用-6) 原体 (96.5%)	マガモ <i>Anas platyrhynchos</i>	♂♀ 各 5 羽	強制 経口 投与	0, 500, 1000, 2000 mg/kg	LD ₅₀ ♂♀ > 2000 mg/kg NOEL ♂♀ 2000 mg/kg	なし	(1983 年)	54

2. 水産動植物以外の有用生物に対する影響

(1) 蚕に対する影響

1) 局所施用および経口投与試験

(資料：有用-1)

試験機関：

(1984年)

検体：①フェノチオカルブ原体 純度：
②パノコン乳剤 フェノチオカルブ 35%

供試生物：蚕 *Bombyx mori* (系統：春嶺×鐘月) 3 齢起虫

①局所施用：検体処理区、無処理対照区、陽性対照区いずれも 1 区あたり 5 頭×3 反復

②経口投与：検体処理区、無処理対照区、陽性対照区いずれも 1 区あたり 10 頭×6 反復

観察期間：48 時間及び 7 日間

投与方法：

①局所施用：検体をアセトンに溶解し、マイクロアプリーケーターで蚕の胸部背面に処理した。

陽性対照区では MEP のアセトン溶液を同様に処理した。

②経口投与：検体を水に希釈して桑の葉を浸漬し、風乾後に蚕を放虫した。

陽性対照区では所定濃度のスミチオン乳剤 (MEP：50%) を同様にして蚕に与えた。

[申請者註：経口投与における希釈溶媒は報告書に明記されていないが、水と考えられる]

観察項目：局所施用については処理後 48 時間後及び処理後 7 日後、経口投与については投与 48 時間後の死亡率を調査した。

試験結果：

①局所施用：

試験区	処理薬量 ($\mu\text{g}/\text{頭}$)	死亡率 (%)	
		48 時間後	7 日後
検体処理区	10	6.7	33.3
	1	0	0
	0.1	0	0
陽性対照区	10	100	100
	1	100	100
	0.1	3.3	26.7
無処理区	—	0	

陽性対照区は $0.1\mu\text{g}/\text{頭}$ の処理量で死亡率が 26.7%、 $1\mu\text{g}/\text{頭}$ 以上の区では死亡率 100% であり、検体処理区では $10\mu\text{g}/\text{頭}$ で死亡率が 33.3%、 $1\mu\text{g}/\text{頭}$ 以下の区では死亡率 0% であった。

②経口投与；

試験区	処理薬量 (μ g/頭)	死亡率 (%)	LC ₅₀
検体処理区 (フェノチオカルブ 35%)	1250	96.7	257 (95%信頼限界： 199~333)
	625	81.7	
	313	43.3	
	156	41.7	
	78.1	15.0	
	39.1	1.7	
陽性対照区 (MEP 50%)	10	100	2.74 (95%信頼限界： 2.40~3.15)
	5	86.7	
	2.5	46.7	
	1.25	5.0	
無処理区	—	0	—

LC₅₀値は、スミチオン乳剤との比較で100倍高い値となった。

以上から、フェノチオカルブの蚕に対する急性毒性はMEPと比べて弱いと考えられる。

2) 桑葉への残留毒性試験

(資料：有用-2)

試験機関：

(1984年)

検体：パノコン乳剤

組成	フェノチオカルブ	35.0%
	有機溶剤、界面活性剤等	65.0%

供試生物：蚕 *Bombyx mori* (系統：春嶺1号×繭月1号、秋光1号×竜白1号)

4 齢起虫

検体処理区、無処理対照区、陽性対照区 いずれも 50 頭×2 反復

観察期間：最大 20 日間

投与方法：桑葉に供試薬剤の 500 倍希釈液、1000 倍希釈液を 100 L/10a 散布し、所定日数後に蚕に与えた。

陽性対照区では DEP 乳剤 (DEP:50%) を 1000 倍に希釈し、桑葉に 100 L/10a を散布後、所定日数後に蚕に与えた。

観察項目：暴露後の死亡率、結繭数、健蛹歩合、繭重量、繭層重量、発育の斉一度を記録した。

試験結果：別添表①②に示す。

春蚕期では、1000 倍希釈液処理区・500 倍希釈液処理区いずれも散布当日の桑葉を与えた蚕に、発育遅延や繭重の低下が見られた。陽性対照区では散布後 5 日後までの桑葉を与えた蚕に繭重の低下が見られた。

秋蚕期では、1000 倍希釈液散布区では散布 3 日後までの桑葉を与えた蚕に、500 倍希釈液散布区では散布 5 日後までの桑葉を与えた蚕に繭重の低下が見られた。陽性対照区では散布後 5 日後までの桑葉を与えた蚕に繭重の低下が見られた。

①春嶺1号×鑑月1号

試験区		4 齢～5 齢 への 経過日数	発育の 齊一度	投与後 13 日後 までの死亡蚕数 (群あたり平均)	減蚕歩合 (%)
検体 1000 倍 処理区	散布後 0 日	12 日間	やや不齊一	0	0
	散布後 5 日	11 日間	齊一	0	0
	散布後 10 日			0.5	1
	散布後 15 日			0	0
	散布後 20 日			0	0
検体 500 倍 処理区	散布後 0 日	13 日間	やや不齊一	0	0
	散布後 5 日	11 日間	齊一	0.5	1
	散布後 10 日			0	0
	散布後 15 日			0.5	1
	散布後 20 日			0	0
陽性 対照区	散布後 5 日	12 日間	やや不齊一	0	0
	散布後 10 日	11 日間	齊一	0	0
	散布後 15 日			0	0
	散布後 20 日			0.5	1
無処理区		11 日間	齊一	0	0

試験区		結繭 蚕数 (群当り 平均)	化繭 歩合 (%)	雌			雄			中毒 症状
				繭 重 (g)	繭層 重(g)	繭層 歩合 (%)	繭 重 (g)	繭層 重(g)	繭層 歩合 (%)	
検体 1000 倍 処理区	散布後 0 日	41	91.7	2.57	0.589	22.9	2.14	0.498	23.3	無し
	散布後 5 日	50	95.0	2.55	0.586	23.0	2.13	0.521	24.5	無し
	散布後 10 日	49	95.8	2.66	0.601	22.6	2.21	0.536	24.3	無し
	散布後 15 日	50	96.0	2.69	0.638	23.7	2.19	0.552	25.2	無し
	散布後 20 日	50	96.2	2.71	0.641	23.2	2.21	0.559	25.3	無し
検体 500 倍 処理区	散布後 0 日	39	75.5	2.41	0.472	19.6	1.63	0.385	23.6	無し
	散布後 5 日	49	89.8	2.52	0.560	22.2	2.08	0.504	24.2	無し
	散布後 10 日	49	98.8	2.58	0.558	21.6	2.07	0.537	25.9	無し
	散布後 15 日	48.5	95.9	2.65	0.595	22.5	2.20	0.572	26.0	無し
	散布後 20 日	50	98.0	2.60	0.570	21.9	2.18	0.562	25.8	無し
陽性 対照区	散布後 5 日	49	91.0	2.64	0.532	20.2	2.17	0.555	25.9	無し
	散布後 10 日	49.5	92.0	2.72	0.571	21.0	2.17	0.561	25.9	無し
	散布後 15 日	49.5	95.0	2.76	0.584	21.2	2.16	0.583	26.9	無し
	散布後 20 日	49.5	96.0	2.70	0.544	20.1	2.19	0.587	26.8	無し
無処理区		50	98.0	2.78	0.640	23.0	2.19	0.585	26.7	無し

②秋光1号×竜白1号

試験区		4 齢～5 齢 への 経過日数	発育の 斉一度	投与後 11 日後 までの死亡蚕数 (群あたり平均)	減蚕歩合 (%)
検体 1000 倍 処理区	散布後 0 日	11 日 10 時間	やや不斉一	1	2
	散布後 3 日	11 日 6 時間	斉一	0	0
	散布後 5 日			0	0
	散布後 7 日			0.5	1
	散布後 9 日			0	0
検体 500 倍 処理区	散布後 0 日	11 日 10 時間	やや不斉一	0.5	1
	散布後 3 日	11 日 6 時間	斉一	0	0
	散布後 5 日			0.5	1
	散布後 7 日			0	0
	散布後 9 日			0	0
陽性 対照区	散布後 3 日	11 日 6 時間	やや不斉一	1	2
	散布後 5 日		斉一	0.5	1
	散布後 7 日			0	0
	散布後 9 日			0	0
無処理区		11 日間	斉一	0	0

試験区		結繭 蚕数 (群当り 平均)	化蛹 歩合 (%)	雌			雄			中毒 症状
				繭 重 (g)	繭層 重(g)	繭層 歩合 (%)	繭 重 (g)	繭層 重(g)	繭層 歩合 (%)	
検体 1000 倍 処理区	散布後 0 日	46	92.6	1.84	0.353	19.2	1.36	0.340	25.3	無し
	散布後 3 日	46.5	93.6	1.91	0.353	18.5	1.48	0.376	25.4	無し
	散布後 5 日	48	95.0	2.11	0.450	21.3	1.79	0.451	25.2	無し
	散布後 7 日	48	95.6	2.24	0.431	19.2	1.81	0.456	25.2	無し
	散布後 9 日	49	96.0	2.25	0.460	20.4	1.79	0.461	25.8	無し
検体 500 倍 処理区	散布後 0 日	45	78.0	2.06	0.441	21.3	1.72	0.428	24.9	無し
	散布後 3 日	46.5	87.7	2.11	0.454	21.5	1.73	0.441	25.5	無し
	散布後 5 日	49	95.0	2.22	0.466	21.0	1.92	0.470	24.5	無し
	散布後 7 日	49.5	96.8	2.24	0.506	22.6	1.93	0.498	25.8	無し
	散布後 9 日	48	95.7	2.21	0.500	22.6	1.97	0.498	25.3	無し
陽性 対照区	散布後 3 日	47	78.0	1.98	0.415	21.0	1.75	0.424	24.2	無し
	散布後 5 日	49	84.5	2.12	0.473	22.3	1.85	0.464	25.1	無し
	散布後 7 日	50	92.0	2.35	0.516	22.0	1.90	0.490	25.8	無し
	散布後 9 日	49.5	92.0	2.29	0.513	22.4	1.94	0.493	25.4	無し
無処理区		49	96.8	2.20	0.491	22.3	1.96	0.490	25.0	無し

※なお、同様の試験を他の試験機関でも行っており、結果は以下の表に示す通りである。

試験機関 (試験年度) (資料番号)	暴露量	試験結果
(1984 年) (有用-2-2)	検体 500 倍希釈液 100L/10a 検体 1000 倍希釈液 100L/10a	安全日数 ・夏蚕 (4 齢) : 豊年×研白 : 500 倍 5 日 1000 倍 2 日 ・晩秋蚕 (4 齢) : 豊年×研白 : 500 倍 6 日 1000 倍 2 日
(1984 年) (有用-2-3)		安全日数 ・夏蚕 (4 齢) : 朝日×東海 : 500 倍 1 日 1000 倍 1 日未満 ・晩秋蚕 (4 齢) : 豊年×研白 : 500 倍 1 日 1000 倍 1 日未満
(1984 年) (有用-2-4)		安全日数 ・夏蚕 (4 齢) : 錦秋×鍾和 : 500 倍 1 日 1000 倍 1 日未満 ・晩秋蚕 (4 齢) : 錦秋×鍾和 : 500 倍 2 日 1000 倍 1 日

以上から、パノコン乳剤を桑の近くで散布した際の蚕に対する安全日数は、500 倍希釈時でおよそ 5 日、1000 倍希釈時でおよそ 2 日と考えられる。

(2) ミツバチに対する影響

1) ミツバチへの経口及び接触毒性試験

(資料：有用-3)

試験機関：

(1977年)

検体：①フェノチオカルブ原体 純度：
②パノコン水和剤 フェノチオカルブ：50%

供試生物：セイヨウミツバチ *Apis mellifera* の働き蜂 日齢不明

経口投与試験では区あたり 10 頭×2 反復

接触毒性試験では区あたり 50 頭×1 反復

試験期間：24 時間

試験方法：

①接触毒性試験

検体をアセトンで溶解し炭酸ガスで麻酔したミツバチの胸部背板に処理した。(それぞれ、50, 100, 200, 400 μ g/頭)。無処理対照区にはアセトン処理した。

陽性対照区には同様に調製したマラソン溶液 (0.158~0.5 μ g/頭)、MEP 溶液 (0.119~0.5 μ g/頭) を処理した。処理 24 時間後の死亡および影響を調べた。

②経口投与試験

検体を 25% ショ糖液で希釈して各所定濃度の懸濁液を調製した (それぞれ、2000, 1000, 500, 250, 125 μ g/200 μ L)。この懸濁液をそれぞれ時計皿に 200 μ L 入れ、さらにこの時計皿を腰高のシャーレ内に静置し、ミツバチを 10 頭ずつ放虫した。(それぞれ、200, 100, 50, 25, 12.5 μ g/頭)。無処理対照区には検体を含まないショ糖溶液を与えた。

陽性対照区には同様に調製した各所定濃度のミクロデナボン水和剤 (NAC : 85%)、あるいは MEP 乳剤 (MEP : 50%) の懸濁液を与えた。放虫 24 時間後の死亡および影響を調べた。

試験結果：

①接触毒性

試験区		経過時間における 累積死亡率 (%)
		24hr
対照区	溶媒 4 μ L	5
	溶媒 1 μ L	0
検体区 (フェノチオカルブ)	400 μ g/頭	80
	200 μ g/頭	24
	100 μ g/頭	16
	50 μ g/頭	2
陽性対照区 (マラソン)	0.5 μ g/頭	95
	0.375 μ g/頭	80
	0.281 μ g/頭	40
	0.211 μ g/頭	30
	0.158 μ g/頭	0
陽性対照区 (MEP)	0.5 μ g/頭	100
	0.375 μ g/頭	95
	0.281 μ g/頭	100
	0.211 μ g/頭	80
	0.158 μ g/頭	65
	0.119 μ g/頭	0

陽性対照区ではマラソン処理区では 0.375 μ g/頭以上で死亡率 80%以上、MEP 処理区では 0.211 μ g/頭以上で死亡率 80%以上となった。一方、フェノチオカルブ処理区は 400 μ g/頭で死亡率 80%となった。

②経口毒性

試験区		経過時間における 死亡率 (%)	LD ₅₀ (μ g/頭)
対照区		0	—
検体区 (フェノチオカルブ 50%)	200 μ g/頭	85	47
	100 μ g/頭	55	
	50 μ g/頭	45	
	25 μ g/頭	20	
	12.5 μ g/頭	15	
陽性対照区 (NAC 85%)	0.5 μ g/頭	80	0.17
	0.25 μ g/頭	65	
	0.125 μ g/頭	30	
陽性対照区 (MEP 50%)	1 μ g/頭	100	<0.1
	0.1 μ g/頭	75	

陽性対照区ではNAC処理区ではLD₅₀が0.17 μ g/頭、MEP処理区では<0.1 μ g/頭となった。一方、検体区ではLD₅₀が47 μ g/頭であった。

(3) 天敵昆虫に対する影響

1) ヤマトクサカゲロウへの影響試験

(資料：有用－4－1)

試験機関：

(2003 年)

検体：フェノチオカルブ原体

純度：

供試生物：ヤマトクサカゲロウ *Chrysoperla carnea* の2 齢幼虫

検体処理区、無処理対照区、陽性対照区：いずれも1 群 30 匹×1 反復

試験期間：7 日間

試験方法：[ドライフィルム法]

検体にアセトン及び Tween20 を添加し、蒸留水を加えて定容した (500 ppm)。試験容器の内
壁ガラス板に上記希釈液を $2\mu\text{L}/\text{cm}^2$ の割合で散布し、乾燥後放虫し、飼料 (コクヌストモド
キの卵) を与えた。陽性対照区は、シメトエート原体にアセトン及び Tween20 を添加し、蒸
留水を加えて定容したもの (430 ppm) を、無処理対照区は蒸留水にアセトン及び Tween20
を添加した溶液を同様に処理した。放虫後 1, 2, 4, 7 日後の死亡数などを調査した。

試験結果：

試験区		経過日数ごとの死亡率 (%)			
		1 日後	2 日後	4 日後	7 日後
検体処理区	500 ppm	13.3	36.7	63.3	90.0
陽性対照区	430 ppm	100	100	100	100
無処理対照区	-	3.3	3.3	3.3	3.3

検体処理区は7 日後の死亡率が 90%であり、陽性対照区よりも遅効的ではあるが強い影響が認め
られた。以上から、フェノチオカルブの適用散布濃度である 500 ppm では、ヤマトクサカゲロウへの
影響があるものと考えられる。

2) チリカブリダニへの影響試験

(資料：有用－4－2)

試験機関：

(2003 年)

検体：フェノチオカルブ原体

純度：

供試生物：チリカブリダニ *Phytoseiulus persimilis* の第一若虫

検体処理区、無処理対照区、陽性対照区：いずれも 1 群 10～13 匹×3 反復

試験期間：48 時間

試験方法：[リーフディスク法]

検体にアセトンを添加し、蒸留水を加えて定容した (500 ppm)。

直径 40 mm のインゲンマメの葉 (リーフディスク) に上記希釈液を $2\mu\text{L}/\text{cm}^2$ の割合で散布し、乾燥後放虫し、飼料 (ナミハダニ雌成虫) を与えた。陽性対照区は、ジメトエート原体にアセトンを添加し、蒸留水を加えて定容したもの (430 ppm) を、無処理対照区は蒸留水にアセトンを添加した溶液を同様に処理した。放虫後 1, 2, 4, 7 日後の死亡数などを調査した。

試験結果：

試験区		累積死亡率 (%) (カッコ内は補正死亡率)	
		24 時間後	48 時間後
検体処理区	500 ppm	100	100
陽性対照区	430 ppm	100	100
無処理対照区	-	0	0

検体処理区と陽性対照区での死亡率に大きな差は認められなかった。

以上から、フェノチオカルブは 35% 乳剤の適用散布濃度である 500 ppm において、チリカブリダニに対し影響があるものと思われた。

3) テントウムシへの影響試験

(資料：有用-4-3)

試験機関：

(1984 年)

検体：①フェノチオカルブ原体 純度：
②パノコン乳剤 フェノチオカルブ：35%

供試生物：ナナホシテントウ *Coccinella septempunctata* の終齢幼虫

①検体処理区、陽性対照区、無処理対照区いずれも 1 群 15 匹×1 反復

②検体処理区、陽性対照区、無処理対照区いずれも 1 群 5 匹×3 反復

試験期間：局所施用試験、虫体浸漬試験、いずれも 48 時間

試験方法：①局所施用試験

アセトンで希釈した検体をマイクロアプリーケーターを用いて局所施用した。処理後 48 時間後の死亡数を記録した。陽性対照として MEP を用いた。

②虫体浸漬試験

金網に入れた供試虫を、水で希釈した所定濃度の薬液に 10 秒間浸漬した。処理後 24 時間後、及び 48 時間後の死亡数などを調査した。陽性対照として、各種殺虫剤を用いた。

試験結果：①局所施用試験

試験区		死亡率 (%)
検体処理区	10 μ g/頭	0
	1 μ g/頭	0
陽性対照区 (MEP)	10 μ g/頭	100
	1 μ g/頭	100
	0.1 μ g/頭	0
無処理対照区	-	0

陽性対照区では 1 μ g/頭の投与で死亡率が 100%となったが、検体処理区では 10 μ g/頭で死亡率 0%であった。以上から、ナナホシテントウへの局所施用における検体の影響は、陽性対照物質 (MEP) よりも弱いと考えられた。

②虫体浸漬試験

試験区			死亡率 (%)	
			1 日後	2 日後
検体処理区 (フェノチオカルブ : 35%)		500 ppm	0	6.7
		100 ppm	0	0
陽性対 照区	スミチオン乳剤 (MEP : 50%)	100 ppm	100	100
		20 ppm	0	0
	プリクトラン (トリシクロヘキシルス : 50%)	500 ppm	66.7	93.3
		100 ppm	6.7	33.3
		20 ppm	0	0
	ダニカット (アミトラズ : 20%)	500 ppm	13.3	20.0
	ケルセン (ケルセン : 40%)	500 ppm	6.7	13.3
無処理対照区		0	0	0

検体処理区では、500 ppm 液処理においても死亡率が 6.7%であり、これはダニカットやケルセン処理区とほぼ同等、プリクトランやスミチオン処理区よりも弱い影響となった。

以上から、35%乳剤の適用散布濃度である 500 ppm において、フェノチオカルブはナナホシテントウへの散布液暴露の影響は弱いものと考えられる。

(4) 鳥類への影響

1) コリンウズラに対する急性毒性試験

(資料：有用－5)

試験機関：

〔GLP 対応〕 (1983 年)

検体：フェノチオカルブ原体

純度：

供試生物：コリンウズラ (*Colinus virginianus*) 18 週齢以上

試験群：投与群あたり雌雄各 5 羽、および対照群：雌雄各 5 羽

試験開始時の体重：雄 155～194 g、雌 155～194 g

観察期間：15 日間 (投与後 14 日間)

投与方法：コーンオイル中に検体を懸濁させ、懸濁液 10 mL/kg 体重を単回強制経口投与した。対照群はコーンオイルのみを 10 mL/kg 体重投与した。

観察項目：死亡例及び一般状態の観察を、1 日 1 回観察した。

試験区ごとの、試験期間中の平均摂餌量を週ごとに測定した。

また、各体重を投与 14 日前、7 日前、投与後、投与 7 日後、投与 14 日後に測定した。

試験結果：

投与方法	強制経口投与
投与量	0, 518, 864, 1440, 2400, 4000 mg/kg 体重
LD ₅₀	♂ 1013 mg/kg (95%信頼限界：656～1503) ♀ 878 mg/kg (95%信頼限界：384～1384) 全体 949 mg/kg (95%信頼限界：706～1227)
死亡開始時間および終了時間	518 mg/kg 群：投与 22 時間後 (♀1 例) 864 mg/kg 群：投与 19～42 時間後 (♂2 例♀3 例) 1440 mg/kg 群：投与 22～91 時間後 (♂4 例♀3 例) 2400 mg/kg 群：投与 19 時間後～2 日後 (♂5 例♀5 例) 4000 mg/kg 群：投与 19 時間後～3 日後 (♂5 例♀5 例)
症状発現時間および消失時間	518 mg/kg 群：投与 19～22 時間後 864 mg/kg 群：投与 19～42 時間後 1440 mg/kg 群：投与 2 時間後～4 日後 2400 mg/kg 群：投与 2 時間後～2 日後 4000 mg/kg 群：投与 2 時間後～3 日後
毒性徴候の認められなかった 最高投与量	♂ 518 mg/kg ♀ <518 mg/kg
死亡例の認められなかった 最高投与量	♂ 518 mg/kg ♀ <518 mg/kg

対照群では死亡例、毒性徴候は認められなかった。

全ての投与群において死亡例及び毒性徴候が認められた。

観察された毒性徴候は、ケージ床への座り込み、横たわり、ケージへの寄りかかり、鎮静、立位不能、立毛、姿勢不安定、閉眼、瀕死（人道的見地から屠殺）、死亡であった。

全ての死亡例は投与4日以内に認められた。

投与後～投与7日後までに、1440 mg/kg 群の雌1例で大きな体重減少が見られたが、検体の影響と考えられた。また、投与後～投与7日後までにの飼料摂取量を調べたが、2400 mg/kg 群の雌雄及び4000 mg/kg 群の雄において減少が見られた。

以上から、フェノチオカルブ原体をコリンウズラへ強制経口投与した場合のLD₅₀は雄 1013 mg/kg、雌 878 mg/kg であった。

2) マガモに対する急性毒性試験

(資料：有用-6)

試験機関：

[GLP 対応] (1983 年)

検体：フェノチオカルブ原体

純度：

供試生物：マガモ (*Anas platyhynchos*) 18 週齢以上

試験群：投与群あたり雌雄各 5 羽、および対照群：雌雄各 5 羽

試験開始時の体重：雄 935~1250 g、雌 850~1100 g

観察期間：15 日間 (投与後 14 日間)

投与方法：コーンオイル中に検体を懸濁させ、懸濁液 10 mL/kg 体重を単回強制経口投与した。対照群はコーンオイルのみを 10 mL/kg 体重投与した。

観察項目：一般状態の観察を、1 日 1 回観察した。

試験区ごとの、試験期間中の平均摂餌量を週ごとに測定した。

また、各体重を投与 14 日前、7 日前、投与前後、投与 7 日後、投与 14 日後に測定した。

試験結果：

投与方法	強制経口投与
投与量	0, 500, 1000, 2000 mg/kg 体重
LD ₅₀	♂♀ >2000mg/kg
死亡開始時間および終了時間	死亡例無し
症状発現時間および消失時間	毒性症例無し
毒性徴候の認められなかった 最高投与量	♂♀ 2000 mg/kg
死亡例の認められなかった 最高投与量	♂♀ 2000 mg/kg

対照群、及び試験群に死亡例、毒性徴候は認められなかった。

投与後の全群の体重は正常範囲内の変化を示し、検体投与に関連した影響は見られなかった。

試験期間中の摂餌量は全群において正常範囲内であった。

全動物において剖検での異常はみられなかった。

以上から、フェノチオカルブ原体をマガモへ強制経口投与した場合の LD₅₀ は雌雄ともに 2000 mg/kg を超える値であった。無影響量は雌雄ともに 2000 mg/kg であった。

VII. 使用時安全上の注意、解毒法等

1. 使用時安全上の注意事項

(1) 35.0%乳剤（パノコン乳剤）

- 1) 傾飲などのないように注意すること。
- 2) 原液は眼に対して極めて強い刺激性があるので散布液調製時には保護眼鏡を着用して、薬剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちに水洗し、医師の手当を受けること。
- 3) 散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。

2. 製造時、使用時における事故例

該当事例なし。

VIII. 毒性

< 毒性試験一覧表 >

1. 原体

資料 番号	試験の種類 期間	供試 生物	1 群当り 供試数	投与 方法	投与量 (mg/kg または mg/kg/day)	LD ₅₀ 値 (mg/kg) または無毒性量 (mg/kg/day)	試験機関 (報告年)	頁
101	急性毒性 14日間観察	マウス	♂♀各10	経口	♂♀ 3570, 6000, 7000, 9800, 13000, ♀ 1880, 2550, 3570, 5000, 7000, 9800	♂ 7000 ♀ 4857	(1978)	163
	急性毒性 14日間観察	マウス	♂♀各10	経皮	♂♀ 2000, 4000, 8000	♂♀ >8000		
	急性毒性 14日間観察	マウス	♂♀各10	腹腔 内	♂♀ 420 (♀), 500, 600, 720, 864, 1040 (♂)	♂ 731 ♀ 595		
	急性毒性 21日間観察	マウス	♂♀各10	皮下	♂♀ 2500, 3000, 3600, 4320, 5180	♂ 3480 ♀ 3510		
2	急性毒性 14日間観察	ラット	♂♀各10	経口	♂♀ 800, 1000, 1250, 1580, 1950	♂ 1150 ♀ 1200	(1978)	(65)
	急性毒性 14日間観察	ラット	♂♀各10	経皮	♂♀ 1280, 1600, 2000, 2500, 3125, 3906	♂ 2425 ♀ 2075		
	急性毒性 14日間観察	ラット	♂♀各10	腹腔 内	♂♀ 289, 347, 418, 500, 600, 720 (♂)	♂ 439 ♀ 428		
	急性毒性 21日間観察	ラット	♂♀各10	皮下	♂♀ 462 (♂), 578, 690, 830, 1000, 1200, 1440	♂ 764 ♀ 803		
18	急性毒性 14日間観察	ウサギ	♀6	経口	♀ 818, 1063, 1382, 1797, 2334	♀ 1382	(1981)	67
27	急性毒性 14日間観察	ラット	♂♀各10	吸入	♂♀ 0.66 (10分), 1.79 (mg/L (4時間全身暴露))	♂♀ >1.79 mg/L	(1982)	68
28	皮膚刺激性 14日間観察	ウサギ	♀6	貼付	♂♀ 各500 mg/動物	刺激性なし	(1980)	71
27	眼刺激性 14日間観察	ウサギ	♀6 ♀3 (洗眼)	点眼	♂♀ 各100 mg/動物	刺激性なし	(1980)	74
30	皮膚感作性 (Draize法)	モル モン	♂10	皮内 注射	感作: 5% 初回0.05 mL それ以降0.1 mL 増強: 5% 0.05 mL	皮膚感作性なし	(1982)	77
40	急性神経毒性	90日間反復経口投与神経毒性試験において神経毒性を示す所見が見られなかったため、本試験は実施なかった。						79
11	急性避毒性 神経毒性 42日間観察	マウス (F1)	♀9, 10	経口	♀ 3000	避毒性神経毒性無し	(1982)	80
12	反復経口投与毒性 3ヶ月間	マウス	♂♀各15	経口	♂♀ 各0, 30, 100, 300, 900 ppm ♂ 5.8, 20.3, 60.7, 190.6 ♀ 8.5, 27.7, 82.0, 241.6	♂♀ 100 ppm ♂ 20.3 ♀ 27.7	(1978)	82
14	反復経口投与毒性 3ヶ月間	ラット	♂♀各15	経口	♂♀ 各0, 30, 100, 300, 900 ppm ♂ 1.8, 6.5, 19.9, 59.8 ♀ 2.1, 7.0, 21.1, 63.4	♂ 6.5 ♀ 7.0	(1978)	88

表中の網掛け部分は、残留農薬安全性評価委員会による毒性評価の際に審査された試験成績である。

資料 番号	試験の種類 期間	供試 生物	1 群当り 供試数	投与 方法	投与量 (mg/kg または mg/kg/dny)	LD ₅₀ 値 (mg/kg) または無毒性量 (mg/kg/dny)	試験機関 (報告年)	頁
113	反復経口投与毒性 (3ヶ月間)	ラット	♂♀各10	経口	♂♀: 0, 30, 300, 900 ppm ♂: 2.1, 21.2, 63.7, 185.1 ♀: 2.2, 22.7, 67.7, 187.8	♂♀: 30 ppm ♂: 2.1 ♀: 2.2	(1984)	194
38	反復経口投与毒性 90 日間	イス	6 週間予備試験及び 1 年間の試験から、90 日間反復投与した際の無毒性量が予測できると考えられたため試験を省略した。					103
37 [GLP]	慢性毒性予備 6 週間	イス	♂♀各 2	経口	♂♀: 0, 2, 4, 8	♂♀: 4	(1987)	104
—	反復経皮投与毒性	急性毒性試験の結果から、本化合物の経皮毒性が経口および吸入毒性よりも強いとは考えられなかったため、本試験は省略した。						108
115 [GLP]	反復吸入毒性 (28日間)	ラット	♂♀各10	吸入	♂♀: 0, 407, 1212 379 mg air/m ³ (6時間/1日, 6日間/週, 全量吸入)	♂♀: 30 ppm ♂: 10.7 mg air/m ³	(1989)	109
39 [GLP]	反復経口投与 神経毒性 90 日間	ラット	♂♀各 10	経口	♂♀: 0, 30, 300, 1000 ppm ♂: 2.02, 19.59, 65.83 ♀: 2.32, 23.10, 76.88	神経毒性なし ♂♀: 300 ppm ♂♀: 19.59	(2004)	116
—	反復経口投与 遅発性神経毒性	急性遅発性神経毒性試験の結果から、本化合物は遅発性神経毒性を有しないと考えられたため試験を実施しなかった。						120
42	慢性毒性予備 (6週間)	マウス	♂♀各10	経口	♂♀: 0, 4000, 6000, 16000, 113500 ♂: 1841, 973, 1823, 2523 ♀: 799, 11155, 1895, 12822	♂♀: < 4000 ppm ♂: 1841, 973, 1823 ♀: 799	(1980)	121
43	慢性毒性予備 (6週間)	ラット	♂♀各10	経口	♂♀: 0, 1800, 1200, 2400, 4800 ♂: 49, 194, 1186 ♀: 52, 1100, 1177	♂♀: (1800 ppm) ♂: 49, 97 ♀: 48, 97	(1980)	124
116	慢性毒性 (発毒性を含む) 24ヶ月	マウス	♂♀各10	経口	♂♀: 0, 100, 2000, 5000 ppm ♂: 147, 313, 1812 ♀: 1075, 366, 1930	♂♀: 100 ppm 遅発性毒性あり ♂: 147, 910, 612 ♀: 1075	(1983)	127
117	慢性毒性 (発毒性を含む) 24ヶ月	ラット	♂♀各 70	経口	♂♀: 0, 30, 1800, 1200 ppm ♂: 186, 37.3, 83.7, ♀: 184, 9919, 188.2	♂♀: 30 ppm 遅発性毒性あり ♂: 186, 97 ♀: 186, 97	(1983)	132
118	慢性毒性 24ヶ月	ラット	♂♀各 70	経口	♂♀: 0, 30, 1800, 1200 ppm	慢性毒性は極めて 低い ♂: 186 ♀: 186	(1983)	132
119 [GLP]	慢性毒性 (12ヶ月間)	イス	♂♀各 4	経口	♂♀: 0, 0.5, 3, 6	♂: 1.5, 97 ♀: 3	(1989)	133

表中の網掛け部分は、残留農薬安全性評価委員会による毒性評価の際に審査された試験成績である。

資料 番号	試験の種類 期間	供試生 物	1群当り 供試数	投与 方法	投与量 (mg/kg または mg/kg/day)	LD ₅₀ 値(mg/kg) 無毒性量 (mg/kg/day) 又は試験結果	試験機関 (報告年)	頁
20	繁殖性/催奇形性 F2世代の 生育検査まで	ラット	♂♀各10	経口	♂: 0.150, 200, 800 ppm ♀: 0.097, 13, 54, 9 0.40, 10, 64 0.093, 6, 14, 59 0.043, 17, 170 0.037, 15, 60 0.041, 17, 60	雄動物: 50ppm (♂3.6, ♀4.0) 雌動物: 200ppm (♂15.0, ♀16.6) 繁殖指標に及ぼす影 響は大きく、催奇形性は ない。	(1982)	168
21 [GUP]	催奇形性 10日間投与	ラット	♂25	経口	♂: 10, 30, 100, 300	雄動物: 80 雌動物: 100 催奇形性はない。	(1988)	169
22	催奇形性 13日間投与	ウサギ	♂12	経口	♂: 10, 100, 500, 1000	雄動物: 100 雌動物: 100 催奇形性2/2あり。	(1981)	184
23	変異原性 [Goo-assay]	枯草菌: H-17AM-45		in vivo	1500, 1000, 5000, 10000 μg/disk	陰性	(1980)	188
24	変異原性 (復帰変異)	ヒスミダフス菌: TA1535, TA1537, TA1538, TA100, TA98株 大腸菌: W2uvrA株		in vivo	♂: 10, 50, 100, 500 1000, 5000 μg/plate	S ₉ -mixの有無に かわらぬ陰性	(1980)	189
25	変異原性 (宿主細胞)	マウス	♂5	経口	♂: 250, 500, 1000 2回投与	陰性	(1980)	191
26 [GUP]	変異原性 (染色体異常)	ヒトリンパ球 卵巣由来細胞(OHO)		in vivo	直接法: 50, 100, 150 200 μg/mL 代謝活性化法: 10, 20, 40, 50 μg/mL	直接法: 陰性 代謝活性化: 陽性	(1989)	193
28 [GUP]	変異原性 (DNA試験)	マウス	♂6	経口	♂: 500, 1000, 2000 2回投与	陽性	(1994)	196
31	生体機能影響	マウス	♂10	経口	♂: 0.1, 40, 700, 3500	700mg/kg以上で口 液運動低下、刺激へ の反応低下、起電力 の低下等。	(1983)	198
		マウス	♂10	経口	♂: 0.1, 40, 700, 3500	全投与群で自発運動 量の低下、投与量の 上昇に伴い発現開始 時間が短縮し、発現 時間が長くなった。		
		ラット	♂10	経口	♂: 0.1, 120, 600	600mg/kg群で投与 後2時間後にATG体 温が低下した。		
		ウサギ	♂4	静注	♂: 0.1, 0.5, 1, 10	10mg/kg以上で呼吸 量増加、10mg/kgで 血管性の血圧低下及 び心拍数減少。		
		回腸 組織	♂5	組織に投与	10 ⁻⁵ - 10 ⁻² g/mL	10 ⁻² g/mLでセザリ ン及びピロシリンによる 収縮の抑制作用あり。		
		ラット 子宮	♂5	組織に投与	10 ⁻⁵ - 10 ⁻² g/mL	10 ⁻² g/mLでセザリ ン及びピロシリンによる 収縮の抑制作用あり。		
		マウス	♂10	経口	♂: 0.1, 40, 700, 3500	700mg/kg以上で消 化管輸送能の低下。		
32	生体機能影響	ラット	♂10	経口	♂: 0.1, 120, 600	600mg/kgで血清中 のブロッサムアミン濃 度の上昇。	(1983)	198
		ラット	♂10	経口	♂: 0.1, 120, 600	600mg/kgで血清中 のブロッサムアミン濃 度の上昇。		

表中の網掛け部分は、残留農薬安全性評価委員会による毒性評価の際に審査された試験成績である。

本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクマイ化学工業株式会社にある。

資料 番号	試験の種類 期間	供試 生物	1 群当り 供試数	投与 方法	投与量	試験結果	試験機関 (報告年)	頁
参考資料	肝内門脈枝内腔 腫瘍の発生試験 (8週間)					(6週間以内)に全投 与群で肝内門脈枝内 腔腫瘍発生した	(1988)	203
	肝内門脈枝内腔 腫瘍の回復性試験					休養により回復する	(1988)	207
	3系統間での 比較試験 (8週間)					肝内門脈枝内腔腫瘍 は3系統いずれにも 発生するが、程度は JP344(Wistar)SDの順 に高くなる	(1983)	210
	IBSP/腫瘍能 力及び腫瘍能への 影響調査(7週間)					IBSP/腫瘍能力及び腫 瘍能への影響は調査 済み	(1983)	213
	腫瘍能比較 試験(7週間)					肝内門脈枝内腔腫瘍 は認められず	(1984)	216
	腫瘍作用調査 (7週間)					肝内門脈枝内腔への 影響が観察される	(1984)	218

表中の網掛け部分は、残留農薬安全性評価委員会による毒性評価の際に審査された試験成績である。

本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクマイ化学工業株式会社にある。

2. 原体中混在物及び代謝分解物

資料 番号	試験の種類 期間	供試 生物	1群当り 供試数	投与 方法	投与量 (mg/kg)	LD ₅₀ 値 (mg/kg) 又は試験結果	試験機関 (報告年)	頁
動物2	急性毒性 ((混在物)3) 14日間観察	ラット	2/10	経口	0.4, 4, 432, 518, 622, 746	0.620 0.622	(1984)	224
	急性毒性 ((混在物)4) 14日間観察	ラット	2/10	経口	0.4, 2083, 2500, 3000, 3600, 4320, 5183	0.3400 0.3600		
	急性毒性 ((混在物)6) 14日間観察	ラット	2/10	経口	0.2, 5000	0.2, 26000		
	変異原性 複発変異 ((混在物)3)	ネズミ胚皮細胞 TA1535, TA1537, TA1538, TA100, TA98株 大腸菌WP2uvrA株		in vitro	0.15, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 µg/plate	陰性	(1983)	225
	変異原性 複発変異 ((混在物)4)	ネズミ胚皮細胞 TA1535, TA1537, TA1538, TA100, TA98株 大腸菌WP2uvrA株		in vitro	0.15, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 µg/plate	陰性		
	変異原性 複発変異 ((混在物)2)	ネズミ胚皮細胞 TA1535, TA1537, TA1538, TA100, TA98株 大腸菌WP2uvrA株		in vitro	0.15, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 µg/plate	陰性		
	変異原性 複発変異 ((混在物)5)	ネズミ胚皮細胞 TA1535, TA1537, TA1538, TA100, TA98株 大腸菌WP2uvrA株		in vitro	0.15, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 µg/plate	陰性		
	変異原性 複発変異 ((混在物)8)	ネズミ胚皮細胞 TA1535, TA1537, TA1538, TA100, TA98株 大腸菌WP2uvrA株		in vitro	0.15, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 µg/plate	陰性		

表中の網掛け部分は、残留農薬安全性評価委員会による毒性評価の際に審査された試験成績である。

資料 番号	試験の種類 期間	供試 生物	1 群当り 供試数	投与 方法	投与量 (mg/kg)	LD ₅₀ 値 (mg/kg) 又は試験結果	試験機関 (報告年)	頁
221	急性毒性 ((代謝物 III)) 14日間観察	ラット	♂♀各10	経口	♂♀ 5000	♂♀ 5000	(1984)	221
	急性毒性 ((代謝物 VIII)) 14日間観察	ラット	♂♀各10	経口	♂♀ 1395(♂), 1167(♀), 2000, 2410, 2894, 3472(♂), 4187(♀)	♂ 2500 ♀ 1840		
	急性毒性 ((代謝物 IX)) 14日間観察	ラット	♂♀各10	経口	♂♀ 1000(♂), 2197(♀), 2368, 2777, 3278	♂ 2510 ♀ 3100		
	急性毒性 ((代謝物 X)) 14日間観察	ラット	♂♀各10	経口	♂♀ 1000, 1200, 1440, 1728	♂ 1150 ♀ 1450		
	急性毒性 ((代謝物 XX)) 14日間観察	ラット	♂♀各10	経口	♂♀ 500(♂), 600(♀), 660(♂), 720, 864, 1092	♂ 745 ♀ 730		
	急性毒性 ((代謝物 XXVII)) 14日間観察	ラット	♂♀各10	経口	♂♀ 2002(♂), 2411(♀), 2894, 3472, 4187, 5000(♀), 6000(♂)	♂ 2710 ♀ 3500		
223	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 III))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性	(1988)	223
	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 VIII))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性		
	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 IX))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性		
	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 X))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性		
	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 XIV))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性		
	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 XV))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性		
	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 XX))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性		
	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 XXII))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性		
	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 XXIII))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性		
	変異原性 / 複発変異 ((代謝物 XXVII))	ネズミチフス菌: TA1538, TA1537, TA1535, TA100, TA98 株 大腸菌: WP2uvrA 株		in vitro	0, 1.5, 10, 50, 100, 500, 1000, 15000 μg/plate	陰性		

表中の網掛け部分は、残留農薬安全性評価委員会による毒性評価の際に審査された試験成績である。

本資料に記載された情報に係る権利および内容の責任はクミアイ化学工業株式会社にある。

3. 製剤（35%乳剤；パノコン乳剤）

資料 番号	試験の種類 期間	供試生物	1群当り 供試数	投与 方法	投与量	LD ₅₀ 値 (mg/kg) または 試験結果	試験機関 (報告年)	頁
8	急性毒性 14日間観察	ラット	20/5/10	経口	2268/2609 3000/3450 3858mg/kg	3080 3200	(1985)	243
34 [GLP]	急性毒性 14日間観察	マウス	20/5/5	経口	3000/3409 3875/4401/5000 5681mg/kg	4899 5998	(1989)	244
9	急性毒性 14日間観察	ウサギ	20/5/5	経皮	2000mg/kg	2000	(1985)	245
10	急性毒性 14日間観察	ラット	20/5/10	吸入	491/688 846mg/L (4時間全身暴露)	5846mg/L	(1985)	246
29	皮膚刺激性 72時間観察	ウサギ	20	経皮	0.5g/動物	刺激性なし	(1985)	249
	眼刺激性 21日間観察	ウサギ	洗浄眼26 洗眼23	点眼	0.1g/動物	強い刺激性		
	希釈液 眼刺激性 21日間観察	ウサギ	洗浄眼26 洗眼23	点眼	0.1g/動物	刺激性なし		
35 [GLP]	皮膚感作性 (Buehler法) 12日間	モルモット	試験群20 対照群210	経皮	感作：原液0.5mL 増強 25%希釈液0.5mL	皮膚感作性 (+)	(1989)	253

表中の網掛け部分は、残留農薬安全性評価委員会による毒性評価の際に審査された試験成績である。